

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 1999.

Agente	Sexo	Masculino	Feminino	Ignorado	T o t a l	
		n°	n°	n°	n°	%
NORTE		4	16	-	20	0,63
Amazônia		3	5	-	8	0,25
Pará		1	11	-	12	0,38
NORDESTE		482	592	2	1076	34,01
Ceará		147	187	-	334	10,56
Rio Grande do Norte		4	4	-	8	0,25
Paraíba		16	15	-	31	0,98
Pernambuco		97	118	-	215	6,80
Salvador		218	268	2	488	15,42
SUDESTE		661	694	10	1365	43,14
Minas Gerais		60	87	-	147	4,65
Espírito Santo		32	27	-	59	1,86
Rio de Janeiro		72	77	4	153	4,84
São Paulo		497	503	6	1006	31,80
SUL		287	329	8	624	19,72
Paraná		66	79	2	147	4,65
Santa Catarina		51	63	1	115	3,63
Rio Grande do Sul		170	187	5	362	11,44
CENTRO - OESTE		34	45	-	79	2,50
Mato Grosso do Sul		8	20	-	28	0,88
Mato Grosso		7	7	-	14	0,44
Goiás		19	18	-	37	1,17
T o t a l		1468	1676	20	3164	100
	%	46,40	52,97	0,63	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento