

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 2000.

Agente	Sexo	Masculino	Feminino	Ignorado	T o t a l	
		n°	n°	n°	n°	%
NORTE		29	43	-	72	1,98
Amazonas		4	6	-	10	0,28
Pará		25	37	-	62	1,71
NORDESTE		428	584	-	1012	27,89
Ceará		207	315	-	522	14,38
Rio Grande do Norte		8	8	-	16	0,44
Paraíba		17	19	-	36	0,99
Pernambuco		22	30	-	52	1,43
Bahia		174	212	-	386	10,64
SUDESTE		806	923	17	1746	48,11
Minas Gerais		78	95	-	173	4,77
Espírito Santo		30	49	-	79	2,18
Rio de Janeiro		138	200	5	343	9,45
São Paulo		560	579	12	1151	31,72
SUL		336	360	2	698	19,23
Paraná		96	95	-	191	5,26
Santa Catarina		59	80	-	139	3,83
Rio Grande do Sul		181	185	2	368	10,14
CENTRO - OESTE		49	52	-	101	2,78
Mato Grosso do Sul		15	19	-	34	0,94
Mato Grosso		9	4	-	13	0,36
Goiás		25	29	-	54	1,49
T o t a l		1648	1962	19	3629	100
	%	45,41	54,06	0,52	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento